

Дата проведение тестирования: 23. 11. 2022 г.  
ФИО тестируемого: Печенкина И.С.  
Место работы: ООО РИМ "Клиника Кару"  
Отделение: Клиника Должность: врач невролог  
Подпись: [подпись] Результат тестирования: \_\_\_\_\_

### POST-TEST: «Профилактика инфекций, связанных с катетером мочевого пузыря»

**1. Каковы последствия от развития КАИМП в стационаре?**

- A. Уменьшает длительности пребывания в стационаре
- B. Развиваются сопутствующих заболеваний в стационаре
- C. Увеличивает длительность пребывания в стационаре
- D. Приводит к улучшению прогноза заболевания
- E. Приводит к уменьшению экономических затрат

**2. Какими путями возбудители проникают в мочевыводящие пути при эндогенном инфицировании?**

- A. Прямой кишки, влагалища
- B. Установка катетеров
- C. Грязные руки
- D. Постельное белье
- E. Очага инфекции

**3. Из скольких этапов состоит эпидемиологически безопасной катетеризации мочевого пузыря?**

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8
- E. 10

**4. Как часто нужно проводить замену катетеров для профилактики КАИМП?**

- A. Проводить по мере необходимости
- B. Проводить только по строгим показаниям
- C. Проводить еженедельно по показаниям
- D. Ежедневно и по мере необходимости
- E. По решению врача или консилиума

**5. Какие меры профилактики должны соблюдать мед персонал при постановке уретральных катетеров и уходе за ними?**

- A. Помыть руки с мылом под проточной водой и обработать антисептиком
- B. Обработать руки антисептиком и использовать нестерильные перчатки
- C. Соблюдать протоколы гигиены рук и использовать стерильные перчатки
- D. Провести дезинфекцию и стерилизацию уретральных катетеров
- E. Обработать руки антисептиком и манипуляционное поле

**6. Какие клинические признаки не характерны для КАИМП?**

- A. Температура выше 380С
- B. Дискомфорт в надлобковой области
- C. Частые позывы к мочеиспусканию
- D. Дизурия и пиурия
- E. Менее 5 бактерий в 1 мл мочи

7. На каком уровне рекомендуется располагать емкости для сбора мочи?

- A. Выше уровня пола, но ниже уровня кровати пациента
- B. Выше уровня пола и на уровне кровати пациента
- C. Выше уровня кровати пациента и в отдельном месте
- D. Можно располагать на уровне пола на коврик
- E. Нет разницы в уровне и месте расположения

8. Что не рекомендуется обрабатывать при установке катетера?

- A. Обработка периуретральной области и уретры антисептиком
- B. Предварительная обработка рук и процедурного столика
- C. Обработка катетера, уретры и области наружного отверстия уретры
- D. Обработка антибиотиками катетера, уретры и периуретральной области
- E. Завершающая дезинфекция расходных материалов и обработка рук

9. Что не рекомендуется обрабатывать при установке катетера?

- A. Обработка периуретральной области и уретры антисептиком
- B. Предварительная обработка рук и процедурного столика
- C. Обработка катетера, уретры и области наружного отверстия уретры
- D. Обработка антибиотиками катетера, уретры и периуретральной области
- E. Завершающая дезинфекция расходных материалов и обработка рук

10. Что рекомендуется для антибактериальной профилактики при трансуретральных эндоскопических процедурах и операциях?

- A. одно/двукратное введение аминогликозидов
- B. одно/двукратное введение макролидов
- C. одно/двукратное введение пенициллинов
- D. одно/двукратное введение рифампицина
- E. одно/двукратное введение фторхинолонов

11. Кто не входит в группу риска развития КАИМП?

- A. Пациенты с патологией мочевого пузыря
- B. Пациенты с иммунодефицитными состояниями
- C. Пациенты с тяжелыми травмами
- D. Пациенты терапевтического профиля
- E. Женщины в постменопаузе

12. Что не является основными факторами риска возникновения КАИМП?

- A. Установка катетера вне операционной
- B. Установка катетера в операционной
- C. Установка на позднем сроке госпитализации
- D. Использование катетеров недопустимых размеров
- E. Эпидзначимые нарушения процедуры катетеризации