

Утверждаю  
Главный врач КГП на ПХВ «ГКБ №4»  
Досмаилов Б.С.  
« 05 » 2022 год



**Режимы периоперационной антибиотикопрофилактики при хирургических операциях**

<b>Операции</b>	<b>Режим профилактики</b>
Экстренные и плановые операции на органах брюшной полости и малого таза	Цефазолин 2 г ± метронидазол 0,5 г

	<p>Цефуроксим 1,5г ±  метронидазол 0,5 г  Амоксициллин/клавуланат 1,2 г  Ампициллин/сульбактам 3 г  Эртапенем 1 г2  <b>При аллергии к бета-лактамам:</b>  Клиндамицин 0,9 г</p>
Эндопротезирование суставов	<p>Цефазолин 2 г  Цефуроксим 1,5 г  <b>При высоком риске MRSA4 :</b>  Ванкомицин 15 мг/кг5  Даптомицин 6 мг/к</p>
Операции на сосудах	<p>Цефазолин 2 г  Цефуроксим 1,5 г  <b>При аллергии к бета-лактамам:</b>  Клиндамицин 0,9 г</p>
Плановая трепанация черепа, имплантация ликворных шунтов, сопутствующих устройств	<p>Цефазолин 2 г  <b>При высоком риске MRSA4 :</b>  Ванкомицин 15 мг/кг</p>
Искусственное прерывание беременности (1 триместр)	<p>Доксициклин моногидрат 100 мг внутрь за 1 час до и 200 мг после операции</p>
Цистоскопия с дополнительными вмешательствами	<p>Ципрофлоксацин 500 мг внутрь за 2-3 часа</p>