

Тестовые вопросы

1. На основании каких исследований можно поставить диагноз дыхательной недостаточности:

1. измерение артериального давления
2. рентгенологическое исследование грудной клетки
3. УЗИ грудной клетки
4. подсчета частоты дыхания
5. исследование биохимической анализы

2. При каких вирусных инфекциях чаще возникает синдром круп:

1. энтеровирусная инфекция
2. парагрипп
3. аденовирусная инфекция
4. ротавирус
5. грипп

3. Деструктивный процесс в легких характерен для пневмонии, вызванный:

1. пневмококком
2. синегнойной палочкой
3. стрептококком
4. стафилококком
5. хламидией

4. Для муковисцидоза наиболее характерны ниже перечисленных формы:

1. отечная
2. преимущественно легочная
3. нефротическая
4. преимущественно сосудистая
5. сердечно-сосудистая

5. Хламидийная инфекция:

1. менингит.
2. ларингит.
3. пиелонефрит.
4. пневмонию.
5. энцефалит.

6. Какое инструментальное исследование необходимо назначить больному для подтверждения диагноза пневмонии?

1. спирография
2. бронхография
3. рентгенография легких
4. пикфлоуметрия

5. сцинтиграфия

7. Для вирусной пневмонии наиболее характерно:

1. острое начало
2. лейкопения
3. склонность к вялому затяжному течению
4. легкое течение
5. гипотермия

8. В пожилом возрасте внебольничная пневмония может проявляться в первую очередь:

1. болями в груди
2. высокой лихорадка
3. кашлем
4. кровохарканьем
5. симптомами интоксикации

9. Внебольничная пневмония (ВП):

1. развивается в домах престарелых
2. развивается в местах заключения
3. развивается во внебольничных условиях
4. развивается дома
5. развивается на работе

10. Внебольничная пневмония чаще встречается после:

1. 15 лет
2. 30 лет
3. 45 лет
4. 50 лет
5. 65 лет и старше

11. Ингаляционный путь попадания в респираторный тракт характерен для:

1. легионелл
2. пневмококков
3. протей
4. синегнойной палочки
5. стафилококки

12. Легионелла это:

1. не встречается при внебольничной пневмонии
2. не вызывает пневмонии
3. не имеет значение при внебольничной пневмонии
4. редкий возбудитель внебольничной пневмонии
5. возбудитель кишечной инфекции

13. Наиболее частым возбудителем при внебольничной пневмонии является:

1. гемофильная палочка
2. кишечная палочка
3. легионелла
4. микоплазма
5. пневмококк

14. Тяжелая внебольничная пневмония вызывает:

1. ТЭЛА
2. боли в ногах
3. высыпание на коже
4. развитие дыхательной недостаточности
5. синдром Рейно

15. Профилактика пневмонии:

1. антибиотикопрофилактика
2. небулайзер терапия
3. вакцинопрофилактика
4. спирография
5. курение

16. Укажите пневмонию, которая не входит в современную классификацию по условиям возникновения:

1. внебольничная
2. крупозная
3. нозокомиальная
4. аспирационная
5. пневмония у лиц с иммунодефицитом

17. Типичным возбудителем внебольничной пневмонии является:

1. *S. pneumoniae*.
2. *Haemophilus influenzae*.
3. *Enterobacteriaceae*.
4. *Escherichia coli*.
5. *Klebsiella spp.*

18. Какой фактор риска не входит при пневмонии, связанной с оказанием медицинской помощи:

1. возраст 65 лет и старше.
2. бактериурия
3. ослабленный иммунитет.
4. потеря веса >10%.
5. сердечно-лёгочная реанимация.

19. Аспергиллез передается:

1. бытовой контакт
2. через еду
3. использованный шприцы
4. воздушно – капельным путем
5. при рукопожатье

20. Какие риски при аспергиллезе:

1. диарея
2. долгосрочная терапия кортикостероидами в больших дозах
3. вирусный гепатит
4. сепсис
5. железо дефицитная анемия